

ORIENTAÇÕES ENDOSCOPIA

PREZADO CLIENTE,

A realização deste exame exige algumas condições e procedimento que são indispensáveis para diagnóstico. Por isso, pedimos a sua atenção no atendimento das instruções abaixo. Agradecemos a sua colaboração e estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Véspera do exame:

Jantar normalmente sem exageros;
Ficar em **jejum** após 22:00;
Não ingerir água ou qualquer tipo de líquido após esse horário.

Após o exame:

- Nas 12 horas seguintes ao exame, caso receba medicação sedativa endovenosa (injeção) **deve repousar, não tomar bebidas alcoólicas, não devem dirigir**, nem realizar tarefas que necessitem atenção, como operar máquinas ou objetos cortantes.
- Mulheres amamentando deverão **suspender a amamentação** por 4 horas após o exame.
 - **Alimentação leve** e somente 02 horas depois do exame.
- Em processos mais sensíveis ou em virtude de dificuldades técnicas, pode ocorrer **inflamação (flebite) ou inchaço (hematoma)** no local da aplicação da medicação endovenosa. Neste caso, sugere-se: compressas geladas e utilização da medicação (pomada reparil).

Em caso de rouquidão ou dor de garganta decorrentes da introdução do aparelho, sugere-se **repouso da voz e hidratação**.

Obs 1: comparecer na clínica com **30 minutos de antecedência com acompanhante maior de 18 anos**. Após o exame, o paciente não poderá dirigir veículos ou voltar para casa sozinho.

Obs 2: **Obrigatório parecer cardiológico** para a realização do exame com anestesia.



CENTROIMAGEM
MEDICINA DIAGNÓSTICA